

### VACUNAS A UTILIZAR ACTUALMENTE

ARN Mensajero	Subunidad proteica
<p><b>COMIRNATY 30 µg</b> (Pfizer) (≥ 12 años edad) intervalo 21 días (mínimo 19 días)</p> <p><b>COMIRNATY 10 µg</b> (Pfizer) (5-11 años edad) intervalo 8 semanas.</p> <p><b>SPIKEVAX</b> (Moderna) (≥ 6 años edad) intervalo 28 días (mínimo 25 días). Dosis de <b>0,50 ml</b> o dosis de <b>0,25 ml</b></p>	<p><b>NUVAXOVID</b> (Novavax) (≥ 18 años edad) intervalo 3 semanas (mínimo 14 días).</p> <p>Para personas con contraindicación a otras vacunas</p>

### POBLACIÓN DE MUY ALTO RIESGO GRUPO 7 E IMUNOSUPRESIÓN

PRIMOVACUNACIÓN: 2 DOSIS + DOSIS ADICIONAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Población 5-11 años:</b> 2 dosis <b>COMIRNATY 10 µg</b> + 1 dosis adicional COMIRNATY 10 µg, a las 8 semanas tras la 2ª dosis</li> <li>■ <b>Población ≥ 12 años:</b> 2 dosis <b>COMIRNATY 30 µg</b> / <b>SPIKEVAX (0,50ml)</b> + 1 dosis adicional <b>COMIRNATY 30 µg</b> / <b>SPIKEVAX (0,50ml)</b> / <b>NUVAXOVID</b> intervalo mínimo 28 días desde la última dosis independientemente de si han pasado la infección</li> </ul>
DOSIS DE RECUERDO (4ª dosis)
<p><b>Población ≥ 12 años:</b> <b>COMIRNATY 30 µg</b> / <b>SPIKEVAX (0,25 ml)*</b> / <b>NUVAXOVID</b></p> <p>→ 1 dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior (mínimo 4 semanas)</p>
CON ANTECEDENTE DE INFECCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Población 5-11 años</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Infección antes de 1ª dosis o entre 1ª y 2ª dosis: <b>COMIRNATY 10 µg</b></li> <li>→ Pauta estándar 2 dosis. La 2ª dosis se administrará a las 8 semanas desde la 1ª dosis</li> </ul> </li> <li>■ <b>Población ≥ 12 años</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Infección antes de 1ª dosis o entre 1ª y 2ª dosis: <b>COMIRNATY 30 µg</b> / <b>SPIKEVAX (0,50ml)</b></li> <li>→ Pauta estándar 2 dosis, tras recuperación de infección e intervalo entre dosis</li> <li>▶ Infección después de la primovacunación: <b>COMIRNATY 30 µg</b> / <b>SPIKEVAX (0,25 ml)*</b> / <b>NUVAXOVID</b></li> <li>→ 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 5 meses desde la última dosis independientemente de la fecha de infección</li> </ul> </li> </ul>

\*En personas que no recibieron la dosis adicional, la dosis de SPIKEVAX será de 0,5ml

**Población general infantil de 5-11 años**

**PRIMOVACUNACIÓN:**  
**COMIRNATY 10 µg**  
→ 2 dosis

**CON ANTECEDENTE DE INFECCIÓN:**

- Infección antes de 1ª dosis → dosis única a las 8 semanas de la infección
- Infección entre 1ª y 2ª dosis → completar 2ª dosis a las 8 semanas de la infección

**Población general de 12-65 años**

**PRIMOVACUNACIÓN:**  
**COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,50ml)** → 2 dosis  
**JANSSEN** ≥ 18 años de edad → dosis única  
**VAXZEVRIA** homóloga o heteróloga Vaxzevria-Comirnaty (≥ 18 años):  
→ 2 dosis intervalo 12 semanas (mín. 21 d)  
**NUVAXOVID** (0,5ml), población ≥ 18 años que → 2 dosis ó 1 dosis (completar la pauta)

**DOSIS DE RECUERDO:**

- ≥ 18 años con primovacunación ARNm o heteróloga VAXZEVRIA  
COMIRNATY: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,25 ml)** / **NUVAXOVID** → 1 dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior (mín. 4 semanas)
- ≥ 18 años con primovacunación homóloga VAXZEVRIA o pauta JANSSEN:  
**COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,25 ml)** / **NUVAXOVID** → 1 dosis tras un intervalo ≥ 3 meses desde la dosis anterior (mín. 4 semanas).

**CON ANTECEDENTE DE INFECCIÓN:**

- Infección antes de 1ª dosis: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,50ml)**  
→ dosis única a las 4 semanas de la infección.
- Infección entre 1ª y 2ª dosis: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,50ml)**  
→ completar 2ª dosis a las 4 semanas de la infección
- Infección después de 2ª dosis: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,25 ml)** / **NUVAXOVID** → 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 5 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas)

**Población >65 años, residentes centros de mayores y grandes dependientes**

**PRIMOVACUNACIÓN:**  
**COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,50 ml)** → 2 dosis

**DOSIS DE RECUERDO:**  
**COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,25 ml)** / **NUVAXOVID** → 1 dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior.

**CON ANTECEDENTE DE INFECCIÓN:**

- Infección antes de 1ª dosis o entre 1ª y 2ª dosis:  
**COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,50ml)** → pauta estándar 2 dosis, tras recuperación de la infección y garantizando el intervalo aconsejado entre dosis
- Infección después de 2ª dosis:  
**COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,25 ml)** / **NUVAXOVID** → 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 5 meses desde la administración de la última dosis



QR de la Guía sobre utilización de vacunas para personal sanitario  
Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 27/05/2022

