RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN EN RESIDENCIAS DE PERSONAS INSTITUCIONALIZADAS



RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN

Personas institucionalizadas



GRIPE

- Vacunación recomendada en **residencias de mayores, centros de atención a la discapacidad e instituciones cerradas. Priorizar al inicio de la campaña.**
- Utilizar preferentemente vacunas mejoradas: adyuvadas o de alta carga antigénica.

VRS VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

- **Una dosis para personas de 60 o más años** que viven en residencias de mayores y de personas con discapacidad.

COVID-19

- Vacunación recomendada en **residencias de mayores, centros de atención a la discapacidad e instituciones cerradas,** independientemente de las dosis recibidas y las infecciones previas.
- Con carácter general, **una dosis, respetando un mínimo de 3 meses** desde la dosis previa o una infección documentada.

Profesionales sanitarios y sociosanitarios



GRIPE

- Vacunación recomendada en **centros públicos y privados.**

COVID-19

- Acceso a la vacunación como **medida de protección individual.**

Familiares, convivientes y cuidadores

GRIPE

- Vacunación recomendada para quienes **proporcionan cuidados domiciliarios** y para **convivientes de personas de riesgo.**



COVID-19

- **Convivientes y cuidadores** de personas de riesgo.



CADA CONTACTO ES UNA OPORTUNIDAD

Revisa el estado vacunal + **Recomienda** + **Resuelve dudas** + **Facilita la vacunación**

Vacunar ayuda a reducir las formas graves, las complicaciones y las hospitalizaciones, favoreciendo la autonomía y la calidad de vida.

COADMINISTRACIÓN: CLAVES DEL ACTO VACUNAL



Gripe + COVID-19 + VRS pueden administrarse en la misma visita cuando estén indicadas.



Utiliza puntos de inyección distintos si se administran varias vacunas al mismo tiempo.



Si administras dos vacunas en el mismo deltoides, **sepáralas al menos 2,5 cm.**



Registrar **en que lugar** se administra cada vacuna.



Si se administran las vacunas en **visitas diferentes,** no requieren un intervalo mínimo entre estas vacunas.

CÓMO REFORZAR LA PREVENCIÓN



Manos

Higiene antes y después del contacto con personas con síntomas o su entorno, y antes y después de usar guantes.



Mascarillas ante síntomas

Quirúrgica para la persona sintomática; para el profesional que la atiende, quirúrgica o de mayor filtración, preferentemente **FFP2.**



Ventilación

Refuerza la **renovación del aire** en periodos epidémicos, especialmente antes y después de actividades comunes y visitas.



Superficies

Intensifica la **limpieza** y desinfección ante casos o brotes.



Visitas

Evita las de personas con síntomas. Si se realizan, residente y visitante deben utilizar mascarilla.



Adapta las medidas

A la situación epidemiológica y las **indicaciones de Salud Pública.**

BIBLIOGRAFÍA

- Recomendaciones de vacunación en residencias de personas institucionalizadas. Temporada 2026-2027. ANENVAC y SEEGG. Octubre de 2026. Disponible en: https://www.enfermeriayvacunas.es/anenvac/anenvac-y-la-see-gg-han-actualizado-el-documento-recomendaciones-de-vacunacion-en-residencias-de-personas-institucionalizadas-temporada-2026-2027/

SEEGG Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica

ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERIA Y VACUNAS

salusplay